

Program Studi Keperawatan
Universitas Widya Husada Semarnag
Semarang, 20 Agustus 2025

ABSTRAK

Septi Kurniyati

HUBUNGAN PERILAKU CARING PERAWAT DENGAN TINGKAT KECEMASAN PASIEN PRE OPERASI ORIF DI RUANG RAWAT INAP RSKB COLUMBIA ASIA SEMARANG

Latar Belakang: Pada pasien pra operasi seringkali mengalami rasa cemas yang berlebihan dan tidak mampu mengendalikannya. Kecemasan tersebut ditandai dengan peningkatan denyut nadi, tekanan darah, dan gangguan sistem imun. Kecemasan yang tidak teratasi menjelang operasi akan membawa dampak buruk bagi pasien. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan perilaku caring perawat dengan tingkat kecemasan pasien pre operasi Orif di Ruang Rawat Inap RSKB Columbia Asia Semarang.

Metode Penelitian: Jenis penelitian yang digunakan yaitu metode kuantitatif dengan desain cross sectional. Penelitian dilakukan pada tanggal 19 Mei sampai 30 Juni 2025 di Ruang Rawat Inap RSKB Columbia Asia Semarang. Instrumen untuk mengukur tingkat kecemasan menggunakan *Amsterdam Preoperative Anxiety and Information Scale* dan mengukur perilaku caring menggunakan *Caring Assement Tools*. Penelitian ini melibatkan 34 pasien pre operasi Orif, dimana teknik sampling yang digunakan yaitu *cosecutif sampling*.

Hasil: Ada hubungan signifikan antara perilaku caring perawat dengan tingkat kecemasan pada pasien pre Orif di Ruang Rawat Inap RSKB Columbia Asia Semarang. Hasil analisis menggunakan uji Rank Spearman menunjukkan bahwa $P\text{ value} = 0,003$ ($<0,05$) dan nilai koefisien korelasi $-0,493$, artinya adanya hubungan negatif dengan kekuatan sedang, dimana semakin baik perilaku caring perawat, maka tingkat kecemasan pasien cenderung semakin rendah.

Kata Kunci: Kecemasan, Orif, Pre Operasi
Daftar Pustaka: 82 (2015-2025)

Nursing Study Program
Widya Husada University, Semarang
Semarang, August 20, 2025

ABSTRACT

Septi Kurniyati

RELATIONSHIP BETWEEN NURSES' CARING BEHAVIOR AND PATIENTS' PRE-OPERATING ANXIETY LEVELS IN THE INPATIENT ward of Columbia Asia Hospital, Semarang

Background: Pre-operative patients often experience excessive and uncontrolled anxiety. This anxiety is characterized by increased heart rate, blood pressure, and immune system disorders. Unmanaged anxiety leading up to surgery can have a negative impact on patients. This study aims to determine the relationship between nurses' caring behavior and pre-OPERATING anxiety levels in patients undergoing ORIF in the inpatient ward of Columbia Asia Hospital, Semarang.

Research Methods: This study used a quantitative method with a cross-sectional design. The study was conducted from May 19 to June 30, 2025, in the inpatient ward of Columbia Asia Hospital, Semarang. The instrument used to measure anxiety levels was the Amsterdam Preoperative Anxiety and Information Scale, and caring behavior was measured using the Caring Assessment Tools. This study involved 34 preoperative Orif patients, using consecutive sampling.

Results: There was a significant relationship between nurses' caring behavior and anxiety levels in pre-Orif patients in the Inpatient Ward of Columbia Asia Hospital Semarang. Analysis using the Spearman Rank test showed a P value of 0.003 (<0.05) and a correlation coefficient of -0.493, indicating a negative relationship with moderate strength. The better the nurses' caring behavior, the lower the patient's anxiety levels.

Keywords: Anxiety, Orif, Preoperative
Bibliography: 82 (2015-2025)

