

ABSTRAK

Istighfaroh

Hubungan Dukungan Keluarga dengan Kepatuhan Minum Obat Pasien Tuberkulosis Paru di Puskesmas Pekalongan Selatan

X + 50 hal + 2 gambar + 6 tabel

Latar belakang: Tuberkulosis (TB) paru merupakan masalah kesehatan masyarakat yang masih menjadi tantangan di Indonesia, terutama terkait kepatuhan pasien dalam menjalani pengobatan jangka panjang. Dukungan keluarga diduga menjadi salah satu faktor penting yang memengaruhi tingkat kepatuhan pasien TB paru.

Metode: Penelitian ini menggunakan desain deskriptif analitik dengan pendekatan cross-sectional. Populasi dalam penelitian ini adalah pasien TB paru di Puskesmas Pekalongan Selatan. Jumlah sampel sebanyak 30 pasien. Analisis hubungan antara dukungan keluarga dan kepatuhan pengobatan menggunakan uji Spearman Rank Rho.

Hasil: Mayoritas responden adalah laki-laki (53,3%), kelompok usia lansia akhir 56–65 tahun (20%), dengan pendidikan terakhir SD (56,7%). Sebagian besar pasien menderita TB paru selama 3–6 bulan (70%). Dukungan keluarga baik diperoleh oleh 63,3% pasien, sedangkan tingkat kepatuhan dalam menjalani pengobatan ditunjukkan oleh 66,7% pasien. Hasil uji Spearman Rank Rho menunjukkan adanya hubungan yang sangat kuat dan signifikan antara dukungan keluarga dengan kepatuhan pasien TB paru ($p\text{-value} = 0,000$; $\rho = 0,929$).

Kesimpulan: Terdapat hubungan yang sangat kuat dan positif antara dukungan keluarga dengan kepatuhan pasien TB paru. Semakin baik dukungan keluarga, semakin tinggi kepatuhan pasien dalam menjalani pengobatan. Disarankan agar tenaga kesehatan lebih mengoptimalkan peran keluarga dalam mendukung keberhasilan terapi TB paru.

Kata Kunci : Tuberkulosis paru, dukungan keluarga, kepatuhan pengobatan

Daftar Pustaka : 35 (2012 -2024)

ABSTRACT

Istighfaroh

The Relationship between Family Support and Medication Adherence in Pulmonary Tuberculosis Patients at Pekalongan Selatan Public Health Center

X + 50 pages + 2 figures + 6 tables

Background: *Pulmonary tuberculosis (TB) remains a major public health challenge in Indonesia, particularly regarding patients' adherence to long-term treatment. Family support is suspected to be one of the important factors influencing the level of adherence in pulmonary TB patients.*

Method: *This research employed a descriptive-analytic design with a cross-sectional approach. The population consisted of pulmonary TB patients at Pekalongan Selatan Public Health Center, with a sample of 30 patients. The relationship between family support and treatment adherence was analyzed using the Spearman Rank Rho test.*

Results: *The majority of respondents were male (53.3%), in the late elderly age group of 56–65 years (20%), with elementary school as the highest education level (56.7%). Most patients had suffered from pulmonary TB for 3–6 months (70%). Good family support was received by 63.3% of patients, while 66.7% of patients demonstrated adherence to treatment. The Spearman Rank Rho test showed a very strong and significant relationship between family support and adherence ($p\text{-value} = 0.000$; $\rho = 0.929$).*

Conclusion: *There is a very strong and positive relationship between family support and treatment adherence among pulmonary TB patients. The better the family support, the higher the patient's adherence to treatment. Health workers are advised to further optimize the role of families in supporting the success of TB therapy.*

Keywords: *Pulmonary tuberculosis, family support, treatment adherence*

References: 35 (2012–2024)