

ABSTRAK

Romadhoni Yusuf

**HUBUNGAN DUKUNGAN KELUARGA DAN KEPATUHAN MINUM
OBAT DENGAN KEKAMBUHAN PADA PASIEN SKIZOFRENIA DI RSJD
Dr. AMINO GONDOHUTOMO SEMARANG**

xvi + 79 Hal + 9 Tabel + 2 Gambar

Latar Belakang: Skizofrenia adalah gangguan mental kronis yang membutuhkan pengobatan jangka panjang untuk mencegah kekambuhan. Dukungan keluarga dan kepatuhan minum obat merupakan faktor penting dalam mencegah kekambuhan. Ketidakepatuhan terhadap pengobatan dapat menyebabkan peningkatan kekambuhan, yang berdampak pada kualitas hidup pasien dan beban keluarga. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui “Hubungan dukungan keluarga dan kepatuhan minum obat dengan kekambuhan pada pasien skizofrenia di RSJD dr. Amino Gondohutomo Semarang

Metode: Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan desain cross-sectional. Sampel penelitian adalah 64 pasien skizofrenia rawat jalan di RSJD Dr. Amino Gondohutomo Semarang, yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling. Instrumen yang digunakan adalah kuesioner dukungan keluarga dan kepatuhan minum obat, serta wawancara untuk mengetahui tingkat kekambuhan pasien. Analisis data dilakukan menggunakan uji Rank Spearman untuk melihat hubungan antar variabel.

Hasil: Hasil penelitian menunjukkan adanya hubungan yang signifikan antara dukungan keluarga dengan kekambuhan pasien ($p = 0,002$; $r = 0,623$) dan antara kepatuhan minum obat dengan kekambuhan pasien ($p = 0,001$; $r = 0,672$). Hubungan ini bersifat kuat dan negatif, menunjukkan bahwa semakin tinggi dukungan keluarga dan kepatuhan minum obat, semakin rendah tingkat kekambuhan.

Kesimpulan: Dukungan keluarga dan kepatuhan minum obat memiliki peran penting dalam menurunkan risiko kekambuhan pada pasien skizofrenia. Tenaga kesehatan diharapkan dapat meningkatkan edukasi terkait pentingnya dukungan keluarga dan kepatuhan terhadap pengobatan dalam manajemen skizofrenia.

Kata Kunci: dukungan keluarga, kepatuhan, kekambuhan, skizofrenia

Daftar Pustaka: 47 (2018–2024)

ABSTRACT

Romadhoni Yusuf

**RELATIONSHIP BETWEEN FAMILY SUPPORT AND COMPLIANCE IN
TAKING MEDICATION WITH RELAXATION IN SCHIZOPHRENIA
PATIENTS AT RSJD Dr. AMINO GONDOHUTOMO SEMARANG**

xvi + 79 Pages + 9 Tables + 2 Figures

Background: Schizophrenia is a chronic mental disorder that requires long-term treatment to prevent relapse. Family support and medication compliance are important factors in preventing relapse. Non-compliance with treatment can lead to increased relapse, which has an impact on the patient's quality of life and family burden. The purpose of this study was to determine the "Relationship between family support and medication adherence with relapse in schizophrenia patients at the Dr. Amino Gondohutomo Mental Hospital, Semarang"

Methods: This study used a quantitative method with a cross-sectional design. The study sample was 64 outpatients with schizophrenia at RSJD Dr. Amino Gondohutomo Semarang, who were selected using a purposive sampling technique. The instruments used were family support and medication adherence questionnaires, as well as interviews to determine the level of patient relapse. Data analysis was performed using the Spearman Rank test to see the relationship between variables.

Results: The results showed a significant relationship between family support and patient relapse ($p = 0.002$; $r = 0.623$) and between medication adherence and patient relapse ($p = 0.001$; $r = 0.672$). This relationship is strong and negative, indicating that the higher the family support and medication adherence, the lower the relapse rate.

Conclusion: Family support and medication adherence play an important role in reducing the risk of relapse in schizophrenia patients. Health workers are expected to improve education regarding the importance of family support and medication adherence in schizophrenia management.

Keywords: family support, adherence, relapse, schizophrenia

Bibliography: 47 (2018–2024)