

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

- 6.1.1 Teknik Pemeriksaan *cervical* pada Kasus *cervical syndrome* di Instalasi Radiologi RSUD Dr. Soeselo Kabupaten Tegal dilakukan dengan menggunakan proyeksi AP dan lateral sudah bisa memperlihatkan *spondylosis* dan daerah *corpus* yang lebih jelas. Selain itu kedua proyeksi ini sudah cukup efektif dalam menegakan diagnosa.
- 6.2.2 Alasan pada pemeriksaan *cervical* pada kasus *cervical syndrome* di Instalasi Radiologi RSUD Dr. Soeselo Kabupaten Tegal menggunakan proyeksi AP dan lateral sudah cukup untuk menegakan diagnosa dan cukup informatif.

6.2 Saran

Pada pemeriksaan *cervical* dengan kasus *cervical syndrome* di Instalasi Radiologi RSUD Dr. Soeselo Kabupaten Tegal sebaiknya dilakukan dengan proyeksi oblique (RAO dan LPO) agar mendapat hasil radiograf yang bisa memperlihatkan foramen *intervertebralis* secara jelas dan lebih informatif untuk menegakan diagnosa *cervical* pada kasus *cervical syndrome*.